




# ANpacken. ZUPacken. GO.

Beim mittelschweren bis schweren **Chronischen Handekzem (CHE)** sind eine schnelle Linderung von Juckreiz und Schmerz essenziell. Als erster und einziger **topischer pan-JAK-Inhibitor**<sup>1</sup> bietet Anzupgo (Delgocitinib-Creme) genau das: eine **topische Therapie** ohne Steroide, **schnelle Linderung** der CHE-Symptome<sup>1,2</sup> und eine **langfristige Krankheitskontrolle**.<sup>3</sup>

Die pan-JAK-Hemmung mit Anzupgo<sup>®</sup> zielt auf die Heterogenität des Chronischen Handekzems<sup>1, 4-6, 8-9, \*\*</sup>

Die Zulassungsstudien DELTA 1, DELTA 2 und DELTA 3 zeigen:

- statistisch signifikante Unterschiede in der Verbesserung des HESD für Juckreiz und Schmerz vs. Baseline mit Anzupgo<sup>®</sup> im Vergleich zur Vehikel-Creme:
  - eine mittlere Juckreizreduktion bereits an Tag 1<sup>2, #</sup>
  - eine mittlere Schmerzreduktion bereits an Tag 3<sup>2, #</sup>
- ein Sicherheitsprofil auf Vehikel-Creme-Niveau, auch im Langzeitverlauf<sup>1, 3</sup>
- Einfache Anwendung: 2x täglich, wenn Bedarf besteht<sup>\*\*\*</sup>



**Anzupgo**<sup>®</sup> : für alle Subtypen des Chronischen Handekzems<sup>4</sup>





**CHE:** Chronisches Handekzem; **HECSI:** Hand Eczema Severity Index; **HESD:** Handekzem-Symptomtagebuch; **JAK:** Januskinase; **STAT:** Signaltransduktor und Aktivator der Transkription; **TYK2:** Tyrosinkinase 2 | \*Anzupgo® wird angewendet zur Behandlung von mittelschwerem bis schwerem Chronischem Handekzem (CHE) bei Erwachsenen, bei denen topische Kortikosteroide nicht ausreichen oder nicht geeignet sind.<sup>2</sup> \*\* Abbildung zur Veranschaulichung, erstellt durch Kombination der relevanten Diagramme und Informationen aus Winthrop KL, et al. Nat Rev Rheumatol. 2017 und Lee GR, et al. Dermatol Ther. 2019. Die Darstellung der Aktivierung des JAK-STAT-Signalwegs wurde zum besseren Verständnis vereinfacht, indem ein Überblick über die Interaktion zwischen Zytokin und Rezeptor gegeben wird, die zu den Symptomen des Chronischen Handekzems führt. # Statistisch signifikante Unterschiede in der Verbesserung des HESD für Juckreiz und Schmerz vs. Baseline wurden mit Anzupgo® im Vergleich zur Vehikel-Creme für eine mittlere Juckreizreduktion bereits an Tag 1 (0,75 vs. 0,32; p<0,001) und eine mittlere Schmerzreduktion bereits an Tag 3 (0,98 vs. 0,58; p = 0,001) beobachtet. § Der Anteil der Patienten mit HECSI-75-Antwort und der Anteil der Patienten mit Reduktion des HESD für Juckreiz/Schmerz von ≥ 4 Punkten wurden bis zu Woche 52 in DELTA 3 beibehalten.<sup>3</sup> \*\*\*Anzupgo® sollte 2x täglich dünn auf die betroffene Haut der Hände und Handgelenke aufgetragen werden, bis die Haut erscheinungsfrei oder fast erscheinungsfrei ist. Bei erneutem Auftreten von Symptomen sollte die 2x tägliche Behandlung von betroffener Haut nach Bedarf wieder aufgenommen werden.<sup>2</sup> | 1. Bissonnette R, et al. Efficacy and safety of delgocitinib cream in adults with moderate to severe chronic hand eczema (DELTA 1 and DELTA 2): results from multicentre, randomised, controlled, double-blind, phase 3 trials. The Lancet 2024;404(10451):461-73. 2. Bauer A, et al. Posterpräsentation, Poster-ID: 53696. AAD, 08.-12. März 2024, San Diego, USA. 3. Gooderham M, et al. Long-term safety and efficacy of delgocitinib cream for up to 52 weeks in adults with Chronic Hand Eczema: Results of the phase 3 open-label extension DELTA 3 trial following the DELTA 1 and 2 trials. J Am Acad Dermatol 2025;93(1):95-103. 4. Tanimoto A, et al. Inflamm Res. 2015;64(1):41-51. 5. Dubin C, et al. Ther Clin Risk Manag. 2020;16:1319-1332. Erratum in: Ther Clin Risk Manag. 2021;17:233. 6. Worm M, et al. Br J Dermatol. 2020;182(5):1103-1110. 7. Giménez-Arnau AM, et al. Lancet. 2025;405(10490):1676-1688. 8. Winthrop KL, et al. Nat Rev Rheumatol. 2017;13(4):234-243. 9. Lee GR, et al. Dermatol Ther. 2019;32(3):e12840 10. Fachinformation Anzupgo®, Stand Oktober 2025.

#### Anzupgo® 20 mg/g Creme

**Zusammens.:** Arzneilich wirksamer Bestandteil: Ein Gramm der Creme enthält 20 mg Delgocitinib. Sonst. Bestandt. mit bekannter Wirkung: Ein Gramm der Creme enthält 10 mg Benzylalkohol (E1519), 0,2 mg Butylhydroxyanisol (E320) und 72 mg Cetylstearylalkohol. Weitere sonst. Bestandt.: Citronensäure-Monohydrat (E330), Natriumedetat, Salzsäure (E507), dickflüssiges Paraffin, Macrogolcetylstearylather, gereinigtes Wasser. Anwend.: Behandlung von mittelschwerem bis schwerem Chronischem Handekzem (CHE) bei Erwachsenen, bei denen topische Kortikosteroide nicht ausreichen oder nicht geeignet sind. Gegenanz.: Überempfindlichkeit gg. d. Wirkstoff od. einen d. sonstigen Bestandteile. Nebenw.: Häufig: Reakt. a. d. Applikationsstelle (Schmerzen, Juckreiz, Rötung und Kribbeln). Verschreibungspflichtig. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Pharmazeutischer Unternehmer: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dänemark. Örtl. Vertreter: LEO Pharma GmbH, 63263 Neu-Isenburg  
**Stand:** Oktober 2025 / MAT-84613



**LEO Pharma GmbH**  
Siemensstraße 5b 63263 Neu-Isenburg  
Kontakt Email: kontakt@leo-pharma.com  
Tel.: +49 6102 2010

**ANpacken.  
ZUPacken.  
GO.**